


ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΉ & ΟΔΟΝΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΡΑΎΜΑ
ΑΘΉΝΑ ΜΆΙΟΣ 2013-ΤΡΊΚΑΛΑ 2025

Αφροδίτη Χατζημανουήλ DDS Hellenic Classical Homeopathic Dental Association, Greece
Παπαδάκη Ελένη DDS, specialized in Paedodontics. Msc Homeopathy
Jelena Nikolau, Veterinarian, Faculty of Homeopathy, Genève-Switzerland
Δερνίκου Φωτεινή DDS,MD Msc Homeopathy
Μιχαλάκης Μιχαήλ DDS, MSc. Specialized in Oral Radiology.

Α)ΑΝΑΤΟΜΙΚΉ ΕΝΤΌΠΙΣΗ ΤΡΑΎΜΑΤΟΣ
Β) ΜΗΧΑΝΙΚΌ>ΘΕΡΜΙΚΌ>ΧΗΜΙΚΌ



ΛΕΥΚΟΠΛΑΚΊΑ

- Προ-καρκινική βλάβη του στόματος,
- **κλινική εικόνα** : λευκές πλάκες που δεν μπορούν να αποκολληθούν, σχηματίζονται στη στοματική κοιλότητα, τις παρειές υπερώα ή και στη γλώσσα.
- **Προδιαθεσικοί Παράγοντες** : **κάπνισμα-αλκοόλ-**HPV.




- Δ.Δ ομαλός λειχήνας , καντιντιαση , ερυθροπλακια ..

Ι. 10-2024 ΑΝΔΡΑΣ 24 ΕΤΩΝ

- Λευκές πλάκες γλωσσα, οπισθιογόμφιο τρίγωνο, παρειές αμφοτερόπλευρα, υπερώα
- Άγχος υγείας –αμφιβολίες κ διακοπή σπουδών.++
- Υπερκόπωση μετά από ερευνητική εργασία στο εξωτερικό ++
- Καπνιστής 20+ άφιλτρα
- διάγνωση λευκοπλακία- θερμικό αίτιο

Θεραπευτικά συστάθηκε:


Στοματοπλύσεις με calendula tinct.


10-2024


10-2024


MOUTH - DISCOLORATION - white patches	3
MOUTH - ITCHING - Palate	3
MIND - ANXIETY - health, about	2
MOUTH - HARD palate	2
MOUTH - INFLAMMATION - Palate	2
MOUTH - BOILS, Gums	0
MIND - WORK - aversion to mental	3
SLEEP - SLEEPLESSNESS - night - midnight - after	2
SLEEP - SLEEPLESSNESS - anxiety, from	2
GENERALITIES - WEAKNESS	2
MIND - COMPANY - desire for	2
MIND - SADNESS, mental depression	2
MIND - LOVE - ailments from disappointed	2
MIND - LOVE - with one of her own sex (Homosexuality)	2

7-2025









….22-7-2025

	(No sort)	Degree	Nux-v. 23/12	Sulph. 24/11	Lach. 22/11	Sep. 22/11	Lyc. 21/11	Puls. 21/11	Ars. 25/10
1.	MOUTH - DISCOLORATION - white patches								
2.	MIND - ANXIETY - health, about		1	2	1	2	3	1	3
3.	MOUTH - HARD palate								
4.	MOUTH - INFLAMMATION - Palate		2		2				
5.	MOUTH - ITCHING - Palate		1					1	
6.	MIND - WORK - aversion to mental		3	2	2	2	2	2	
7.	SLEEP - SLEEPLESSNESS - night - midnight - after		3			2	1	1	3
8.	SLEEP - SLEEPLESSNESS - anxiety, from		1	1					3
9.	GENERALITIES - WEAKNESS		2	3	3	3	2	2	3
10.	MIND - COMPANY - desire for		2			2	3	2	3
11.	MIND - SADNESS, mental depression		2	3	3	3	3	3	3
12.	MIND - LOVE - with one of her own sex (Homosexuality)			2	2	1		3	
13.	MIND - AMBITION - increased		3	2	1		1	1	1
14.	MIND - THOUGHTS - thoughtful		1	1	2	2	1		
15.	MOUTH - HEAT - Palate								
16.	MIND - THEORIZING			4	1	2	1		1
17.	MIND - IDEAS - abundant		2	2	3	1	2	2	2
18.	GENERALITIES - AIR - open - amel.			2	2	2	2	3	3

- Βελτίωση κλινικης εικόνας.
- Όμως συνεχίζει να αποζητά το κάψιμο της θερμότητας του καπνο στην υπερώα – αυτοτιμωρία ? +++
- Ζεσταίνεται-θέλει καλό αερισμό ύπνο++
- Φιλόδοξος & κριτικάρει ++
- Μελετά φιλοσοφία στην μετάβαση
- ……
- 7-2025 Sulphur 200ch,1M/3 +(vit-C & **Vit-E 400 IU**)

  ……
- 20-8-25 Κ-Φ

The Role of Vitamin-E in Cancer Chemoprevention Can Be Summarized As: (Role of Vitamin E in Prevention of Oral Cancer -J Clin Diagn Res. 2014 Oct 20;8(10):ZE05–ZE07)

Inhibits oral cavity carcinogenesis.
Reduces the risk of developing oral cancer.
Causes reversal of premalignant lesion like oral leukoplakia.

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΟΔ/ΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ



- Ιατρικό και Οδοντιατρικό ιστορικό (Πότε? Που? πως?)
- Κλινική εξέταση
- Έλεγχος ζωτικότητας (δόντια)
- Κατάλληλος ακτινογραφικός έλεγχος

Calendula

Χρησιμοποιείτε το βάμμα της που προέρχεται από το φυτό Calendula officinalis. Είναι φάρμακο πρώτων βοηθειών καθώς έχει επουλωτική, αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακή και αντιμυκητιασική δράση.
Σημεία: έντονος πόνος και αδυναμία, πολύ εντονότερο του αναμενόμενου σύμφωνα με το τραύμα. Φλεγμονή ή έλκος.

Ιδιότητες: Προωθεί γενικά την επούλωση.

Χρήση: σε ανοικτά τραύματα, πληγές, εγκαύματα, κατάγματα.
Στοματοπλύσεις.
Αιμόσταση:Μετά από οδοντιατρικές εργασίες , όταν δεν υπάρχει επούλωση και συνεχίζεται η αιμορραγία. Επίσης σε τραύματα μυών και τενόντων.

(Χημικός τραυματισμός βλεννογόνου)
Chlorhexidin **







ΜΗΧΑΝΙΚΌ > ΘΕΡΜΙΚΌ > ΧΗΜΙΚΌ



Πτώση ! Οδοντικές επιπλοκές

- Α) ενσφήνωση & ομοιοπαθητικό
- Β) εκγόμφωση
- Γ)κατάγματα

II. ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΓΙΛΟΥ ΤΟΜΕΑ- Θεσσαλονίκη 4/2006

Αγόρι, 3ετων. Μετα από πτώση τραυματίστηκε στη περιοχή του κεντρικού νεογιλού τομέα.

Εμφάνισε ελεγχόμενη αιμορραγία στους βλεννογόνους των χειλιών και των ούλων

Στην περιοχή του τραύματος, παρουσίασε **έντονο οίδημα**.

Στην εξέταση ο δεξιός νεογιλός τομέας (51) δεν φαινόταν καθόλου.Ακτινογραφικός έλεγχος έδειξε ότι ο νεογιλός τομέας εισήλθε εντός του οστού.



Θεραπευτικά: Δόθηκε **Arnica 1M**

Σε 2μερες το τραύμα είχε καλή όψη και κάτι διακρινόταν εντός του τραυματισμένου ουλικού ιστού.

Δεν έγινε κάποια άλλη παρέμβαση στη περιοχη.

Παρακολούθηση:Σε 15 μέρες ο νεογιλός τομέας φαινόταν ευκρινέστερα εντός της στοματικής κοιλότητας και σε διάστημα **2μηνων επανήλθε στη θέση του**,

Χωρείς ουδέποτε να δημιουργήσει πρόβλημα μέχρι τη φυσιολογική του απόπτωση.

Μηχανικό>Θερμικό>Χημικό

ARNICA MONTANA



Η ορεινή, χόρτο ποώδες κ πολυετές της οικ. Σύνθετα, απαντάτε στο βόρειο ημισφαίριο και την Ελλάδα.(Θράκη)

Εικόνα : Αφήστε με ήσυχο, Φοβάται ή αποφεύγει το άγγιγμα

Ακόμα και σε σοβαρές περιπτώσεις διώχνει τον ιατρό.+++ είμαι καλά

Αίσθημα μωλωπισμού++ , άλγους, δυσκινησία Ευερέθιστος, αν πονά δεν επιθυμεί παρέα.

Ύπνος : Τα νιώθει όλα σκληρά+ Δεν βολεύεται στο κρεβάτι –στριφογυρνά.++

Ζεστό κεφάλι – κρύο κάτω μέρος σώματος &άκρα ειδικά στο πυρετό.

Του μυρίζει χαλασμένο αυγό++ και γεύση στο στόμα. Βήχα μετά από κλάμα σε παιδιά+

Ενδείξεις: **Τραυματισμός// μωλωπισμός// αιμορραγία**

Δράση: προλαμβάνει την διαπύηση, την σηπτική κατάσταση και προάγει την απορρόφηση φλεγμονωδών υγρών

Οδ/κες χειρουργικές πράξεις, ανάλογα της έκτασης και της βαρύτητας κάκωσης του οστού θα κυμανθεί η δυναμοποίηση (200ch-1M μέσες τιμές).

Διάσειση και μωλωπισμούς που συνοδεύονται από καταπληξία ή κακώσεις. Σε άτομα που επί μακρύ χρονικό διάστημα υφίστανται επίδραση μηχανικών κακώσεων & πίεσης ,ιδίως αν είναι της ίδιας φύσης επαναλαμβανόμενες. Κακώσεις με αμβλεία όργανα ,σε επιλεγμένα κατάγματα με άφθονη διαπύηση. Προδιάθεση σε τραυματισμούς

Στηθάγχη. Θλάση ή ρήξη μαλακών μορίων.

Αριστερόπλευρη παράλυση και αλαλία μετά από τραύμα.

Πρόληψη: αιμοστατική δράση θαυμάσια μετεγχειρητική εικόνα **και** σε **οφθαλμολογικά περιστατικά.**

Αντενδείξεις: σε λύση της συνέχειας του δέρματος, όπως τα έλκη ποδιών. Το αρχικό διάλυμα-απόσταγμα είναι **ακατάλληλο για στοματική χρήση ακόμα και σε αραίωση.**

Συμπληρωματικά: μετά από τραυματισμό: R-tox, Apis, Calc-c, Hyper, Ipap, Led, Nat-S , Psor ,sulph

ΜΗΧΑΝΙΚΌ – ΕΝΗΛΊΚΩΝ!

- Α) ενσφήνωση
- Β) εκγόμφωση
- Γ)κατάγματα+ ομοιοπαθητικό







III. Β'ΙΑ // 16-2-2010


Θεραπευτικά:

Α) ανάταξη
Β) Arnica
Γ)…










ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΡΙΖΑΣ



Θεραπευτικά

Ανάταξη κατάγματος

- Arnica 200ch
- Symphytum 12 ch/30
- Προάγει την δημιουργία οστίτη ιστού σε κατάγματα

- Πώρωση με:
- Ενασβεστιωμενο οστό
- Εναπόθεση συνδετικού ιστού
- Συνδυασμός εναπόθεσης συνδετικού και οστού

SYMPHYTUM OFFICINALE



- Το **Symphytum** παράγεται από το φυτό σύμφυτον το ιατρικόν. Ως ομοιοπαθητικό φάρμακο χρησιμοποιείται σε τραύματα οστών και οφθαλμών.

Ενδείξεις:

- Σε κατάγματα, **βελτιώνει την πώρωση** των καταγμάτων. Πόνος στα οστά ή περιόστεο μετά από κακώσεις. Τραύματα του βολβού.
- (30ch/20 days)

Αντενδείξεις: πριν την ανάταξη του κατάγματος
Osteopetrosis & Osteogenesis imperfecta

Το περιστατικό παρέμεινε ασυμπτωματικό +10Y.

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΚΟΎ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎ

- Κοντό άνω χείλος
- Σύγκλειση 2ης ταξης
- Στοματική αναπνοή
- Οριζόντια πρόταξη>4mm
- Ψυχογενείς παράγοντες & Υπερκινητικότητα

Αντιμετώπιση/ **πρόγνωση**

πριν την 1 ώρα Έγκαιρη Αντιμετώπιση

μετά την 1 ώρα> Καθυστερημένη >>

- Ορθή διάγνωση **& Θεραπεία** Ακινητοποίηση όταν είναι απαραίτητη (Ορθοδοντικό σύρμα 0.2-0.3mm με ή χωρείς brackets από 2-3 εβδομάδες)
- **Παρακολούθηση…**

Κανένα περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται το ίδιο ακόμα και στον ίδιο ασθενή

Ενημέρωση

http://www.dentaltraumaguide.org.

ΜΗΧΑΝΙΚΌ>*ΘΕΡΜΙΚΌ*>ΧΗΜΙΚΌ

IV. 6-2014 **Υπερευαισθησία του 23**

Υπερευαισθησία λόγω αυχενικής αποτριβής

HYPERICUM PERFORATUM



Το Hypericum προέρχεται από το γνωστό μας Βάλσαμο βαλσαμόχορτο ή σπαθόχορτο

Ενδείξεις: Σε περιπτώσεις τραυματισμού νεύρων ή απολήξεων νεύρων (διότι προάγει την επούλωση του νευρικού ιστού)(ειδικότερα των αισθητικών νεύρων, στα κινητικά το causticum είναι επιλογή)

Υπερευαισθησία οδοντικού πολφού, τραυματισμός άκρων και περιοχών με πλούσια νεύρωση / Νευραλγία τριδύμου

Κλινικη αντιμετωπιση:



hypericum 200ch/ H_2O_2




τοπική εφαρμογή

Εικόνα:

ο πόνος αντανακλά προς τα άνω.

Χειρότερα με την επαφή και την παραμικρή κίνηση

Μηχανικό>Θερμικό>Χημικό



V. ΆΛΓΟΣ ΚΓΔ


- 5-2025 Συνάδελφος 84Υ παρουσιάζει από μηνός άλγος στην δεξιά κροφογναθική άρθρωση στην αρχή της μάσησης.
- Ο πόνος συνοδεύεται απο μετατόπιση του Δ- κονδύλου πρόσω και έξω της κροταφικής γλύνης.
- Η παθολογία ξεκίνησε μετα από **υπερέκταση διάνοιξης** του στόματος **«χασμουρητό»**
- κροταφογναθική διάρθρωση **συνδέει** την κάτω γνάθο με το κρανίο, ακριβώς μπροστά από τον ακουστικό πόρο.

Είναι μια **πολύπλοκη** άρθρωση **3D** που επιτρέπει την κίνηση της κάτω γνάθου προς τα **πάνω, κάτω, μπρος, πίσω και πλάγια**, απαραίτητη για την ομιλία, την μάσηση και την κατάποση.

Παθολογία: ανωμαλίες στην οδοντικές επαφές **{σύγκλειση}** μεταξύ άνω & κάτω γνάθου ασκεί πίεση στη άρθρωση προκαλώντας συχνά κροταφογναθικό σύνδρομο.

ΚΛΙΝΙΚΉ & ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΉ ΕΞΈΤΑΣΗ

- Μετατόπιση του Δ- κονδύλου της κάτω γνάθου προς τα έξω κατά την διάνοιξη.
- Ψηλάφηση σε μασητήρα- κροταφίτη και έσω πτερυγοειδή… Κ/Φ
- Στην εξέταση της σύγκλεισης παρατηρήθηκε **απουσία της** αριστερά σε 3 δόντια συνέπεια
- **ακτινογραφικά τερηδονισμός των 16, 15, 14**



Η **ασσυμετρία της σύγκλεισης** αριστερά ευθύνεται για την μετατόπιση του Δ -κονδύλου πρόσω και έξω της κροταφικής γλύνης.

Επιπλέον η αδυναμία μάσησης στην αριστερά πλευρά επιβαρύνει την δεξιά κροταφογναθική.

Η θεραπευτικά έλαβε: Rhus-tox 200ch/εβδομάδα & αποκατάσταση της σύγκλεισης αριστερά..



ΕΙΚΌΝΑ RHUS-TOX

mind: Υπάρχει σαν ενοχλητική κεντρική ιδέα η δυσκαμψία και γι' αυτό πρέπει να κινείται συνέχεια το σώμα, το συναίσθημα, το μυαλό.
Είναι όπως μια φαγούρα των αρθρώσεων

- **Χειρότερα στην αρχή της κίνησης**
- Αίσθημα εξάρθρωσης, σαν να ξύνει ένα μαχαίρι το οστό
- Πόνος χειροτερεύει τα μεσανυχτα, στριφογυρίζει στο κρεβάτι ,το μαξιλάρι του φαίνεται σκληρό, το τριγωνικό άκρο της γλώσσας είναι κόκκινο
- Χειρότερεύουν με την υγρασία, **Καλύτερα με την κίνηση**, και τον ζεστό καιρό
- Προληπτικός-ψυχαναγκαστική συμπεριφορά
- Δυσκαμψία ειδικά στο σβέρκο με ή χωρείς τραυματισμό
- **Ενδεικνύεται**
- **μετα από υπερβολική έκταση**
- Πόνο καταγμάτων
- **Δυσλειτουργίες κροταφογναθικής διάρθρωσης**
- Αρθρητικά
- Εξαίρεση **Χορηγήται το *Nat-S*** *αν εχει προηγηθεί* **Τραύμα κεφαλής** *με την παραπάνω εικόνα*

ΣΥΝΔΡΟΜΟ COSTEN - 1934

- **ο James Costen** ήταν ο πρώτος που κατέγραψε τα χαρακτηριστικά της κροταφογναθικής δυσλειτουργίας το 1934 και **την συνέδεσε με προβλήματα σύγκλεισης των δοντιών**. Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη ποιότητα ζωής του ασθενή, διότι δυσχεραίνει καθημερινές λειτουργίες όπως η μάσηση, η κατάποση και η ομιλία.
- Η πάθηση επηρεάζει την κάτω γνάθο (σιαγόνα), τις κροταφογναθικές αρθρώσεις και τους μασητικούς μύες και εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες σε αναλογία 2:1.
- Τα αίτια της πάθησης μπορεί να σχετίζονται άμεσα με τη φυσιολογία της άρθρωσης, αλλά, αρκετές φορές, η πρωτογενής αιτιολογία είναι ψυχολογικής φύσεως. Οι δυσλειτουργίες της κροταφογναθικής διάρθρωσης εμφανίζονται συνήθως όταν είτε η ίδια η άρθρωση είτε οι μύες που την ελέγχουν βρίσκονται κάτω **από έντονη πίεση ή συνεχή φόρτιση**
. **Τα κύρια αίτια του κροταφογναθικού συνδρόμου (ΚΓΣ) είναι :**
- **Κακή σύγκλειση δοντιών -- Βρουξισμός** (σφίξιμο και τρίξιμο των δοντιών).
- Άγχος και ψυχολογική πίεση. --Τραυματισμοί της γνάθου, της άρθρωσης ή των μυών μπορεί να εξελιχθούν σε δυσλειτουργία της ΚΓΔ
- Επαγγελματικές συνήθειες όπως πχ. κάποιος που μιλάει πολύ ώρα στο τηλέφωνο στηρίζοντας το ανάμεσα στο κεφάλι και τον ώμο.
- Κακή στάση σώματος και κλίση της κεφαλής προς τα εμπρός κατά τη πολύωρη εργασία σε υπολογιστή.
- Υπερβολικές κινήσεις, όπως **το υπερβολικό άνοιγμα του στόματος** πέραν του φυσιολογικού ορίου πχ. σε ένα χασμουρητό

Μηχανικό>Θερμικό>Χημικό





VI

- Dog, Labrador, Cordy, arrives 07.05.12 to the clinic with a swollen tongue (approximately 3 times of it's normal size), owner suspects a bee bite. While we were arriving in clinic with a colleague, assistant was asked to give him **Apis 30C**. In appr. 7 minutes the tongue became 5 times bigger, and violet.

SCARY?…

WHAT WOULD YOU DO?

While driving at the clinic, we divided the tasks with the colleague: he took care of getting Cortisone in the syringe just in case, and me—Apis 200C. Owner was kindly asked to wait in a waiting room ☺

While dog was salivating and trying to get his tongue out of his mouth with the paws like a foreign body, I prayed… and gave Apis 200C. After first dose of homeopathy we started making the videos (attached).

2 DOSES 200CH /10MIN

- After first dose in about 10 minutes the tongue started to diminish in size (appr. 1/3) and dog started calming down. I repeated the dose of Apis 200C
- In another 10 minutes the dog became sleepy, her breething became very calm and deep, tongue continued to become smaller. In another 10 minutes he could close his mouth and the tongue wasn't visible outside anymore. Dog fall asleep just on the floor of the clinic and slept for 30 minutes. Then he received fluids s/c. At home it was advised not to eat or drink that evening and come on control next morning. When he stood up, he was salivating much less and could lick his muzzle.
- Next morning… The dog was fine! **WITH NO CORTISONE!**



Video_98_May8_1053am.mp4



Video_106_May8_1059am.mp4


Μηχανικό>Θερμικό>Χημικό




VII. 17-9-2011 ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΉ ΠΆΡΕΣΗ ΔΕΞΙΆ







30ch



200ch +2h



VIII. ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2013

- Causticum 30/200ch

……

- Στον ιδιο ασθενή
- Δήξη μέλισσας στην υνιακή περιοχή του τριχωτού της κεφαλής προκάλεσε εντονο αλγος ,θυμό και ξαφνικη αδυναμία των ανω και κατω ακρων εντος 20 λεπτων από το συμβάν.
- Δώθηκε Apis 200ch/1M και Rescue Remedy, η κινητικότητα των κάτω άκρων επανήλθε μετά από 30 λεπτά μετά την λήψη του 200ch.

IX. 10-2021 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΌ ΆΝΔΡΑ 50 ΕΤΏΝ, ΕΜΠΛΟΚΉ ΣΕ ΤΡΟΧΑΊΟ

- Χωρείς εμφανή τραυματισμό- αρνήθηκε διακομιδή με ασθενοφόρο (συνοδηγός!)
- Αργά το απόγευμα έντονη ζάλη – αδιαθεσία
- Τη ιδιά νύχτα έντονη ναυτία με εμέτους αδυναμία βάδισης&vertigo-αστάθεια έλαβε **Arnica 200ch/ και 1M/2 caps** το επόμενο πρωί.
- Μετέβη στο νοσοκομείο μετα από 48h
- αξονική και α/α κεφαλής ΚΦ

ARNICA-ΔΙΆΣΕΙΣΗ 100ΚΜ/Η





ΔΙΆΣΕΙΣΗ-TIPS

- παρακολούθηση στο σπίτι για 24 ώρες, από κάποιο δικό σας πρόσωπο. Το βράδυ πρέπει να σας ξυπνάει κάθε 1-2 ώρες για να βλέπει την κατάστασή σας. Αν εμφανιστεί κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα, απευθυνθείτε αμέσως σε Νευροχειρουργό :
- • λήθαργος ή δυσκολία στην αφύπνιση
- • σύγχυση, αλλαγή στη συμπεριφορά
- • ναυτία, έντονη ζάλη, εμετοί
- • λιποθυμία
- • εκροή διαφανούς υγρού (σαν νερό) από τη μύτη ή το αυτί
- • αδυναμία (παράλυση) σε κάποιο χέρι ή πόδι
- • δυσκολία στην ομιλία
- • αμνησία («δεν θυμάμαι πως χτύπησα, ποιος με έφερε εδώ..» κλπ)
- • σπασμοί
- • πονοκέφαλος που δεν σταματάει με ένα απλό παυσίπονο (πχ Depon)

Τονίζεται πως, το αν υπάρχει ανοικτό τραύμα ή καρούμπαλο σε μία κάκωση κεφαλής, δεν έχει καμία σχέση με τη βαρύτητα της κάκωσης. Υπάρχουν άνθρωποι που εμφάνισαν μεγάλο τραυματικό αιμάτωμα χωρίς καμία ορατή εξωτερική κάκωση και αντίστροφα, υπάρχουν άνθρωποι με μεγάλο τραύμα στο δέρμα του κεφαλιού, χωρίς καμία άλλη νευρολογική συνέπεια. Συνεπώς, το αν μία κάκωση κεφαλής είναι σοβαρή, το δείχνει όχι το εξωτερικό τραύμα, αλλά **τα συμπτώματα**.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (TBI)

2 εκατομυρια TBI / χρόνο (ενα/ καθε 15 δευτερολεπτα).

Κάθε 5 λεπτα ενας ανθρωπος πεθαίνει Από TBI

5,3 εκατομμύρια αμερικανών ζουν με χρονια δυσλειτουργία αποτέλεσμα συνεπεια TBI. τα αυτοκινητιστικά αποτελούν το 31.8% of TBI Θανάτων

- οι άντρες εχουν υψηλότερα ποσοστά από τις γυναίκες να το πάθουν
- 75% των TBI χαρακτηρίζονται ως μέσης βαρύτητας "mild."
- το ετήσιο κοινωνικό κόστος Σ.Υ. ξεπερνά $76.5 Δισ
- το αντίστοιχο κόστος για τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι στις ΗΠΑ $53.9 δισ για το 2010.

Αιτιες:


51% -Motor Vehicle Accidents τροχαια

21% - Falls- πτώσεις

12% - Assaults and Violence-BIA

10% - Sports αθλητικες Δραστηριότητες

6% -Άλλες.




ΚΦ

ΘΕΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ NAT-S :ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΩΣ «ΕΙΔΙΚΌ ΦΆΡΜΑΚΟ» ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΌΠΩΣ «ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΣ ΚΕΦΑΛΉΣ» ΑΠΌ ΔΙΆΣΕΙΣΗ ΈΩΣ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΌ ΤΡΑΎΜΑ

- **Ενδείξεις:** μεταβολή **συμπεριφοράς** μετά από **τραυματισμό κεφαλής** ,**χειρότερα με τον υγρό καιρό** ,**απογευματινές κεφαλαλγίες**
- **2ο γραμμής φάρμακο, μετά την Arnica συμπληρωματικό**
- **εικόνα:**
- Σοβαρά, κλειστά και υπεύθυνα άτομα
- ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΣΜΟΣ, (κυρίως με όπλο) , ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ και τις υποχρεώσεις απέναντι σε αυτούς.
- Διανοητικά και συναισθηματικά συμπτώματα που προέρχονται μετά από τραυματισμό κεφαλής ή σπονδυλικής στήλης.
- Άτομα που έχουν κουραστεί από τη ζωή, δύσθυμα, πρέπει να αποτρέπουν τον εαυτό τους από την πραγμάτωση των αυτοκτονικών ιδεών. Δεν θέλουν να συναντούν άλλους ανθρώπους, να μιλούν, είναι ευαίσθητοι, καχύποπτοι και αναπτύσσουν συναισθήματα κακίας και εκδικητικότητας.
  Φόβος για τους ανθρώπους.
  Ευαισθησία στους θορύβους, δεν αντέχουν την μουσική που τους φέρνει δάκρυα
  Πρωινή κατάθλιψη λογω απόγνωσης !! θεραπείας (despair of recovery).
- Τα συμπτώματα χειροτερεύουν πάντα σε υγρό καιρό.
- Άσθμα μετά από θλίψη 4-5 το πρωί // Φωτοφοβία

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

- Aconitum για το σοκ
- **Cantharis** για εγκαύματα
- **Ledum** τραύμα από οξύαιχμα αντικείμενα & με μικρή αιμορραγία
- **Staphysagria**, μετά από χειρουργικές τομές ή βαθύ κόψιμο του δέρματος, ο έντονος πόνος περιγράφετε ως σαν μαχαίρι στο κόκκαλο > το βραδυ.
- **Silicea** βοηθά στην αποβολή ξένου σώματος μικρών διαστάσεων for helping to extrude small foreign bodies
- Arnica μωλωπισμό &αιμορραγία
- **Ruta** σε ξηρό φατνίο, είναι η "Arnica" του περιόστεου
- Hypericum & causticum για τα νευρα αισθητικα/κινητικα
- Apis: περιφερικό οίδημα, οίδημα κάτω από τα μάτια, πόνος καυστικός σαν τσιμπημα μέλισσας ..



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Κάθε τραυματισμός είναι **διαφορετικός** από τον προηγούμενο.
- Ακόμα και στο ίδιο άτομο, σε συνάρτηση με την ηλικία και τον χρόνο αντιμετώπισης καθορίζεται η θεραπευτική του προσέγγιση.
- Η πλήρης **εξέταση** ,τα κατάλληλα **μέσα αξιολόγησης** και η **ταχύτητα** με την οποία θα γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί συγκλίνουν στην θεραπευτική αποκατάσταση.
- Οι Καταλληλοι ιατρικοί χειρισμοί είναι απαραίτητοι και αξιολογούνται κατά περίπτωση σε σχεση με την πορεία της επουλώτικης διαδικασίας που επιτανχύνεται με το κατάλληλο ομοιοπαθητικό φάρμακο - simillinum

Ευχαριστώ



POST TRAUMATIC STRESS

- **Aconite**
- Stramonium,
- and Arnica
- Opium *,
- Gelsemium,
- and Phosphoric acid
- Ignatia and Natrum-mur (συνοδευεται με απώλεια)
- Calcarea carbonica, Arsenicum, and Cocculus
- Nitric acid and Aurum metallicum
- κλπ.